
зисных приобретений, новообразований возраста, социальных факторов - в исследуемой группе и группе сравнения на основных этапах.

Как видно из таблицы 4, достоверные и существенные различия в пользу исследуемой группы здесь прослеживаются лишь по среднему показателю социальных факторов с 1-го по 4-ый этапы.

В целом, результаты, полученные при настоящем исследовании, свидетельствуют о позитивном влиянии экспериментальной программы ПНП на динамику формирования социальных факторов устойчивости у зависимых от опиоидов, направляемых на прохождение стационарной МСР.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И СОЦИАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ У ЗАВИСИМЫХ ОТ ОПИОИДОВ, ПОЛУЧАВШИХ И НЕ ПОЛУЧАВШИХ ПЕРВИЧНУЮ НАРКОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ, В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЦИОНАРНОЙ МСР И ПОСТРЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

А.Л. Катков, Е.В. Ережепов

Введение

В ходе реализации программы Treetnet по разработке и внедрению новых, эффективных форм и методов наркологической помощи нами проводилось исследование эффективности экспериментальной программы первичной наркологической помощи (ПНП) у зависимых от опиоидов, которые в последующем проходили программу стационарной МСР. В частности, исследовались особенности динамики показателей качества жизни и социального функционирования у зависимых от опиоидов, получавших и не получавших первичную наркологическую помощь, в ходе прохождения стационарной МСР и пострерабильтационном периоде. На основании полученных результатов делались выводы об эффективности экспериментальной программы ПНП в отношении динамики показателей качества жизни и социального функционирования у зависимых от опиоидов в ходе прохождения стационарной МСР и пострерабильтационном периоде.

В таблице 1 приведена динамика показателей коэффициента соотношения (КС) в исследуемой группе и группе сравнения на основных этапах.

Как видно из таблицы 1, при наличии сходной позитивной динамики показателя КС в сравниваемых группах, достоверные и существенные различия в пользу исследуемой группы прослеживались на 1-ом и 4-ом этапах. На 5-ом заключительном этапе, соотношение 0,86 в пользу исследуемой группы перекрывалось значениями доверительных интервалов.

В таблице 2 приведена динамика показателей коэффициента диссоциации (КД) в исследуемой группе и группе сравнения на основных этапах.

Как видно из таблицы 2 в исследуемой группе имела место более устойчивая, но менее интенсивная динамика снижения показателя КД к его оптимальному значению (от 0,9 до 1,1). Существенные и достоверные различия в пользу исследуемой группы прослеживались на всех этапах – с 1-го по 5-ый.

Результаты, полученные по настоящему фрагменту, свидетельствуют о существенно более высоком качестве жизни и более адекватной оценке собственного состояния у зависимых от опиоидов, проходивших экспериментальную программу ПНП на предварительном этапе.

В целом, по результатам настоящего исследования, следует отметить, что существенно более благоприятная динамика прохождения стационарной МСР и пострерабильтационного периода достигалась благодаря более высокому уровню терапевтической мотивации на достижение приемлемого результата, получению адекватных сведений о наркологической болезни и путях достижения здоровья на предварительном этапе. Благодаря чему пациенты лучше усваивали реабилитационный опыт и могли его использовать на пострерабильтационном этапе.

В существенно меньшей степени данный результат был обусловлен несколько более благоприятной динамикой психопатологических синдромов у пациентов исследуемой группы, связанной со сдерживанием прогрессивности биологических изменений на этапе ПНП.

Таблица 1

Характеристики показателя коэффициента соотношения (КС)
в исследуемой группе ($n = 102$) и группе сравнения ($n = 136$)

Сроки Группы	0 мес.	1 мес.			2 мес.			0,5 года			1 год		
		Абс.	Соотноше ние	P	Абс.	Соотноше ние	P	Абс.	Соотноше ние	P	Абс.	Соотноше ние	P
Исследуемая группа	0,51	0,6	1,18	<0,01	0,6	1,0	1,18	-	1,0	1,18	0,52	0,86	-
Группа сравнения	0,46	0,6	1,3	<0,01	0,6	1,0	<0,01	<0,01	0,89	1,09	0,45	0,9	-
Соотношение	0,9	1,0			1,0				0,83		0,86		
P	<0,05	-			-				<0,01		-		

Таблица 2

Характеристики показателя коэффициента диссоциации (КД)
в исследуемой группе ($n = 102$) и группе сравнения ($n = 136$)

Сроки Группы	0 мес.	1 мес.			2 мес.			0,5 года			1 год		
		Абс.	Соотноше ние	P	Абс.	Соотноше ние	P	Абс.	Соотноше ние	P	Абс.	Соотноше ние	P
Исследуемая группа	1,4	1,4	1,0	-	1,3	0,93	<0,05	1,3	1,0	0,93	1,2	0,92	-
Группа сравнения 1	1,7	1,5	0,88	<0,01	1,5	1,0	-	1,4	0,93	<0,05	1,5	1,07	-
Соотношение	1,21	1,07			1,15	1,07		1,07	0,82		1,35	0,88	
P	<0,01	<0,05			<0,01			<0,05			<0,05		