

ИНФОРМАЦИЯ И ОБЗОРЫ

ДИНАМИКА СИНДРОМА АНОЗОГНОЗИИ У ЗАВИСИМЫХ ОТ ОПИОИДОВ НА ЭТАПЕ ПНП

Е.В. Ережепов

Введение

В ходе реализации программы Treetnet по разработке и внедрению новых, эффективных форм и методов наркологической помощи нами проводилось исследование эффективности экспериментальной программы первичной наркологической помощи (ПНП) зависимых от опиоидов. В частности, исследовались особенности динамики синдрома анозог-

нозии у зависимых от опиоидов на этапе ПНП. На основании полученных результатов делались выводы об эффективности экспериментальной программы ПНП в отношении редукции синдрома анозогнозии у зависимых от опиоидов на этапе ПНП.

В таблице 1 приведены характеристики динамики синдрома анозогнозии в общей экспериментальной группе зависимых от опиоидов на этапе ПНП.

Таблица 1

Характеристика динамики синдрома анозогнозии в экспериментальной группе (n=715)

Сроки	0 мес. (n=712)				3 мес. (n=611)				6 мес. (n=552)			
	Среднее значение	Среднее значение	Соотношение	Р	Среднее значение	Соотношение	Р	Среднее значение	Соотношение	Р		
1. Общая оценка тяжести в баллах	28,8	27,7	0,96	-	25,12	0,9	<0,05	25,12	0,87	<0,01		
2. Адекватность переживания болезни (<i>признание наркологического заболевания</i>)	64,1	66,8	1,04	-	74,6	1,12	<0,05	74,6	1,16	<0,01		
3. Переживание вреда болезни (<i>угроза + противостояние</i>)	50,3	54,2	1,08	<0,05	64,0	1,18	<0,01	64,0	1,27	<0,01		
4. Субъективная позиция по отношению к лечению (<i>доверие</i>)	61,5	63,4	1,03	-	68,46	1,08	<0,05	68,46	1,11	<0,05		

Как видно из таблицы 1, существенные и значимые различия по уменьшению тяжести основных проявлений синдрома анозогнозии отмечались, в основном на 3-ем отслеживаемом этапе. Так, по параметру оценки тяжести синдрома анозогнозии в баллах соотношение со стартовыми показателями здесь составило 0,87 при $p < 0,01$. По параметру адекватности переживания болезни – 1,16 при $p < 0,01$. По па-

раметру переживания вреда – 1,27 при $p < 0,01$. По параметру отношения к лечению – 1,11 при $p < 0,05$.

Полученные при настоящем исследовании результаты свидетельствуют о достаточно высокой терапевтической активности экспериментальной программы ПНП в отношении проявлений синдрома анозогнозии у зависимых от опиоидов, получающих данный вид помощи.